



## Zugelassene Indikationen

Kultur Auswahl Indikationen	Schaderreger	Aufwandmenge Roundup® PowerFlex l/ha
Ackerbaukulturen vor der Saat	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Ackerbaukulturen (ausg. Raps) bis BBCH 03 nach der Saat	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Ackerbaukulturen nach der Ernte oder nach dem Wiederergrünen	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	3,75
Getreide (Vorernte, Lagergetreide, ausg. Saat- und Braugetreide) *1	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	3,75 7 Tage Wartezeit
Getreide (Vorernte, ausgenommen Saat- und Braugetreide) *2	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75 7 Tage Wartezeit
Futtererbse, Ackerbohne	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	3,0 7 Tage Wartezeit
Senf-Arten, Brassica-Arten (z. B. Winter-, Sommerraps)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	3,0 7 Tage Wartezeit
Stilllegungsflächen (Rekultivierung)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Wiesen, Weiden	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Obstgehölze: Kernobst, Steinobst, johannisbeerartiges Beerenobst, Schalenobst (ab Pflanzjahr)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75 42 Tage Wartezeit
Weinrebe (ab 4. Standjahr)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Ackerwinde)	2 x 3,75 30 Tage Wartezeit
Gemüsekulturen vor der Saat oder vor dem Pflanzen	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Gemüsekulturen nach der Ernte oder nach dem Wiederergrünen	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	3,75
Zierpflanzenbau und Rasen, zur Kultur- vorbereitung, vor der Saat	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Nadelholz, Laubholz	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	3,75
Nadelholz nach Abschluss des Kultur- pflanzenwachstums (ausgenommen: Douglasie, Lärche)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	2,25
Baumschulgehölzpflanzen (ab Pflanzjahr, streichen)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	33 % max. 7,5
Wege und Plätze mit und ohne Holzgewächse (streichen)	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	33 % max. 7,5

Quelle: Monsanto, März 2015

\*1 Getreide (ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation): WA700 Eine Anwendung ist nur auf Teilflächen erlaubt, auf denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen oder von Zwiewuchs in lagernden oder stehenden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist.

\*2 Getreide (ein- und zweikeimblättrige Unkräuter): WA701 Eine Anwendung ist nur auf Teilflächen erlaubt, auf denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist.

NG351 Mit diesem und anderen glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln dürfen innerhalb eines Kalenderjahres auf derselben Fläche maximal 2 Behandlungen mit einem Mindestabstand von 90 Tagen durchgeführt werden. Die maximale Wirkstoff-Aufwandmenge von 3,6 kg pro ha und Jahr darf dabei nicht überschritten werden.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten.